

## טופס הסכמה - אנדוסקופיה של מערכת העיכול

אנדוסקופ הינו צינור גמיש המצויד במערכת אופטית המאפשרת לראות את חלל צינור העיכול. במכשיר קיימת "תעלת עבודה" דרכה ניתן להעביר מכשירים לצורך נטילת ביופסיות, כריתת פוליפים, צריבת נקודות דם וטיפול בדליות. אורכו של האנדוסקופ נע בין 1.20 מטר ל-1.80 מטר, קוטרו 1 ס"מ, וניתן בעזרתו לבדוק את מערכת העיכול העליונה והתחתונה.

בדרך כלל, לפני הבדיקה, מקבל הנבדק תרופות הרגעה ו/או אילחוש מקומי על מנת להפחית את תחושת אי הנחות שבבדיקה. האנדוסקופיה מבוצעת כאשר הנבדק שוכב על צידו השמאלי, כאשר מדובר בבדיקה של דרכי עיכול עליונות (גסטרוסקופיה, דואודנוסקופיה, אזופגוסקופיה) מוחדר האנדוסקופ דרך הפה.

כאשר מדובר בבדיקה של דרכי עיכול תחתונות (קולונוסקופיה, סיגמואידוסקופיה) מוחדר האנדוסקופ דרך פי הטבעת, בהמשך מוחדרים דרכו מכשירים בהתאם לפעולות הנדרשות.

משך הבדיקה נע בין 15 דקות לשעה.

במשך הבדיקה קיימת הרגשה של אי נוחות ונפיחות בבטן.

פרטי החולה:

שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_ שם האב \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_

אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי קיבלתי הסבר מפורט בע"פ מאת פרופ' / ד"ר \_\_\_\_\_

שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_

על הצורך בביצוע בדיקת \_\_\_\_\_ אבחונית / ואו טיפולית לרבות לקיחת ביופסיות, כריתת פוליפים, צריבת נקודות דם וטיפול בדליות, פרט לטיפול אחר \_\_\_\_\_ (להלן: "הטיפול העיקרי")

הוסבר לי על קיומן של חלופות אבחנתיות, יתרון וחסרון, תופעות הלוואי שלהן והסיבוכים האפשריים.

אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי הוסברו לי תופעות הלוואי של הטיפול העיקרי לרבות כאב, אי נוחות ותחושת נפיחות בבטן. כמו כן הוסברו לי הסיבוכים האפשריים לרבות: דימום או קרע של דופן מערכת העיכול אשר בחלק מן המקרים יצריכו תיקון ניתוחי. בבדיקת דרכי עיכול עליונות עלול להיגרם נזק לשיניים עקב החדרת המכשיר דרך הפה. הסיבוכים האמורים אינם שכיחים.

